links gewundene Hemiplecta, martini Pfr. gehört wohl sicher zu Dyakia, javana und striata, wie oben erwähnt, zu Xestina, während nemorensis und rareguttata nach Pfeffer „Hemiplecta-ähnliche Ariophanten“ sind. Hier ist also noch viel zu sichten; jedenfalls erscheint es voreilig ohne sorgfältige anatomische Untersuchung bezw. Nachprüfung neue Gattungen aufzustellen. Uns Schalenmenschen wird dies oft mit viel geringerem Recht zum Vorwurf gemacht.

Kowno, Mai 1898.

Dr. v. Möllendorff.

Neue Buliminiden aus Gansu.

Von

Prof. P. V. Gredler.*)

1. *Napaeus vincentii Gredler.*

T. umbilicata, conica, solida, striata, in cervice aliquot costulis incrementi distantibus ornata, nitida, nigro-purpurea, apice obtusiusculo; anfr. 7 convexi, regulariter crescentes, ultimus dilatatus alte ascendens; apertura valde obliqua, oblonga, pariete sinuata; peristoma late expansum, intus forisque albidum, margo interior prominulus, obtusus, exterior acutus, fragilis, marginibus conniventibus callo brevi junctis, ad insertionem nodulo caesio valido. Long. 9, lat. ult. anfr, 5 mm.

Buliminus (Napaeus) Vincentii Gredler, zur Conchylienfauna von China XIX Stück, p. 5 fig. 1.

Hab. in parte meridionali prov. Gansu, lg. Potanin.

2. *Buliminus pupopsis Gredler.*

T. mediocris, perforata, cylindrica, apice citius attenuato, conico, obtusiusculo; anfractibus primis humilibus, ultimis

---

*) Diagnosen abgedruckt aus dem Programm des Bozener Gymnasiums für 1898. —

tribus altis parum convexis, solida, laevis, nitida, translucida, albido-hyalina, rarius cornea; apertura tribus laminis fortioribus coarctata, columellari una, parietali una et palatali $^1/_3$ anfractus longa, foris translucida; peristomate albo aut isabellino, tumido- labiato, expanso, margine interiori supra reflexo, duobus callo junctis. ad insertionem tuberculo ornatis. — Lond. 15, lat. 5 mm.

Buliminus gansuicus Schalfejew in sched.
— pupopsis Gredler l. c. p. 6 fig. 2.

Hab. in parte meridionali prov. Gansu, leg. Potanin. Muss wohl eine besondere Gattung bilden.

3. *Zebrina schalfewi Gredler.*

T. elongato-fusiformis, solida, obscura, cinereo-albida, striis irregulariter sparsis fuscinis, nitidula, anguste perforata. Anfr. $9^1/_2$ minus (apicalibus plus) convexis regulariter accrescentibus, sutura superficiali; apertura mediocris, parum obliqua, elongato- ovata, ad sinulum acuminata, intus fulvescens et linea palatali introrsum dilatata obscuriore, duobis callis ad insertionem et retro in pariete levibus ornata, peristomate labioso, expanso, haud reflexo, albido, marginibus callo tenui junctis, sinistro supra dilatato, adnato. — Alt. 20, diam. 5, dim. apert 6:5 mm.

Buliminus (Zebrina) Schalfewi Gredler l. c. p. 8 fig. 4.

Hab. prope Nan-pin prov. Gansu, leg Potanin.

4. *Buliminus hyacinthi Gredler.*

T. anguste fusiformi-turrita, perforata, striatula, nitida, tenuis, castanea; anfr. $8^1/_4$ convexi, sensim, ultimi celerius accrescentes, ultimus ante aperturam usque ad perforationem medio depressulus, sutura impressa in fine magis oblique decurrens, apertura relative magna, ovalis, obliqua; peristoma simplex, acutum, luridum: margo externus vix incrassatus parumque expansus, internus supra late expansus, ad perforationem reflexiusculus, incrassatus, marginibus callo tenui, ad insertionem tuberculato junctis. — Long. 8,5 –9, diam 2 mm.

Buliminus Hyacinthi Gredler l. c. p. 8 fig. 4.

Hab in parte meridionali prov. Gansu.

Hat den Habitus einer kleinen Clausilia.

5 *Buliminus rhabdites Gredler.*

T. respectu generis angustissima, filiformis, apice obtuso, solidula, arcte umbilicata, purpurea, conspicue striata; anfr. $7\frac{1}{2}$ parum convexi, regulariter crescentes, ultimus medio constrictus, basi obtuse cristata, sutura filaris; apertura verticalis, ovalis; peristoma simplex, breviter sed plane expansum. albidum, marginibus conniventibus, callo forti junctis. turberculo ad insertionem rubido. — Long. 8, diam. 1 mm.

Buliminus rhabdites Gredler l. c. p. 9 fig. 5.

Hab. in parte meridionali prov. Gansu.

Genus **Serina** Gredler.

T. angusta. cylindrico-turrita, polygyrata, anfractibus. convexis; apertura oblongo-rotundato; peristoma late expansum, duplex, planum aut canaliculatum, vix reflexum, margo aperturae (internus) obtusiusculus plus minusve prominulus, super parietem haud interruptus, sine tuberculo ad insertionem, externus acutus, cervix applanata, basis cristata.

6. *Serina cathaica Gredler.*

T. gracillima, turrita, perforata. solidula, irregulariter striata, parum nitens, atro-purpurea. Anfractus 8 convexi, sensim accrescentes, sutura impressa duplici. cinerea sejuncti, ultimus ad cervicem magis striatus, applanatus, ad basim crista obtusa infra impressionem marginata circumdatus;

apertura generi propria, oblongo-rotunda; peristoma expansum, isabellinum, quasi triplex, margo internus haud porrectus, medius inconspicue elevatus; callus parietalis minus fortis. Long. 10. lat. 2,25 mm.

Serina cathaica Gredler l. c. p. 11 fig. 7.

Hab. in parte meridionali prov. Gansu.

7. *Serina ser Gredler.*

T. gracilis, turrita, umbilicata, solida, laevis, nitidissima lactea, anfractibus tribus apicalibus rufinis. Anfr. $8^1/_2$—$9^1/_2$, regulariter ac lente crescentibus, sutura duplici impressa sejunctis, valde convexis, ultimo retro complanato et crista obtusa circa umbilicum coronato; apertura arcta, subrotunda, intus lutea; peristoma late expansum, duplex, album margo (aperturae) interior fortis, etiam ad parietem continuus, obtusus, prominulus, quasi annularis, et solo sinulo parvo sejunctus, margo exterior acutus, paululum in medio excavatus, minime reflexus. Long. 14—15, lat 4 mm.

Serina ser Gredler l. c. p. 11 fig. 8.

Hab in parte meridionali prov. Gansu.

Eine äusserst zierliche Art, wie aus Porzellanmasse, Typus der Gattung Serina.

8. *Serina sub-ser Gredler.*

T. gracillima, turrito-cylindrica, anguste umbilicata, solida, pene laevis, nitidula, cretaceo-alba, apice fuscino. Anfr. $9^1/_2$ convexi, sensim crescentes, sutura simplici impressa sejuncti, ultimus ad cervicem applanatus, ad basin crista obtusa circa umbilicum coronatus; apertura angusta, ovato- rotundata, intus pariete et columella sinuata; peristoma late expansum, planum, haud reflexum, margine duplici, interiore vix prominulo, continuo, solo sinulo sejuncto, exteriore acuto, fragili. Long. 10,5—14, diam. 2,5 mm.

Serina subser Gredler l. c. p. 12 fig. 9.

Hab in prov. Gansu meridionali.